



Производител:  
**Arysta Lifescience  
France**



Вносител:  
**КАЛИОП АГРО  
БЪЛГАРИЯ ООД**  
гр. София,  
бул. Шипченски проход 79  
тел.: 02/971 37 40, 02/870 00 33,  
факс: 02/870 73 68  
e-mail: [caliop\\_agro@abv.bg](mailto:caliop_agro@abv.bg)

# ИЗОР 500

СЕЛЕКТИВЕН  
ХЕРБИЦИД  
ПРИ ЖИТНИТЕ,  
СУСПЕНЗИОНЕН  
КОНЦЕНТРАТ,  
СЪДЪРЖАЩ  
500 Г/Л  
ИЗОПРОТУРОН



Arysta LifeScience

### МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

**ИЗОР 500** се поема основно от кореновата система на плевелите и частично от листата като блокира преноса на фотосинтетични електрони и така нарушава фотосинтезата, в следствие на което плевелите загиват. При суша има забавено действие. Създава устойчив разтвор с вода.

Разгражда се бързо през вегетацията и не е опасен за следващите в сеитбооборота култури.

### УПОТРЕБА:

Препоръчва се есенно приложение на **ИЗОР 500**, предвид това, че при засушаване или ниски температури не се разгражда от почвените микроорганизми и слънчевата радиация и така се увеличава неговата продължителност на действие (персистентност).

При създаване на благоприятни условия за вегетация на културата и плевелите, **ИЗОР 500** проявява своето хербицидно действие като унищожава плевелите. Приложен през пролетта като вегетационен хербицид е необходимо културата да бъде във фаза 3-ти лист до края на братене, да има нормална почвена и атмосферна влага, ранни фази и високо тургурно състояние на плевелите. Всички тези фактори трудно се съчетават, затова се препоръчва есенното приложение – почвено или вегетационно. Освен това третираните площи през есента не се налага да се третират срещу едногодишни плевели през пролетта.



Култура	Доза	Приложение
Пшеница и ечемик	400-500 мл/дка	Срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели
		След сеитба преди поникване на културата
Пшеница и ечемик	350 мл/дка	Срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели
		Вегетационно – след 3-ти лист на културата до края на братене, но при ранни фази на плевелите

### СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

**ИЗОР 500** контролира успешно икономически най-важните едногодишни плевели.

**Житни:** лисича опашка, метлица, пиявица, ветрушка, едногодишен райграс и др.

**Широколистни:** попова лъжичка, овчарска торбичка, лечебен росопас, див синап, звездица, бяла куча лобода, див мак, подрумче, незабравка.

### СМЕСИМОСТ:

**ИЗОР 500** е смесим с голям брой широколистни хербициди. Препоръчва се да не се смесва с течни торове, да не се пръска при температура по-висока от 25°C.

**РАБОТЕН РАЗТВОР:** 20-40 л/дка. Да не се третират слаби, измръзнали и повредени от болести и неприятели посеви. Да не се прилага при почви с хумусно съдържание под 1%. Да се спазват всички мерки за безопасност при работа с пестициди.

**ЛД-50** – орално за плъх 3600 мг/кг живо тегло.

**КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:** III-та.

### НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРЯ:

Лечение – симптоматично. Няма антидот.

Терапия – медицински въглен с вода, като очистително се прилага магнезиев сулфат или нитрат.

