ЕО ТОР

СОЛДЕФЕНД

СК

ЗАЩИТАВА ПЛОДОВЕТЕ ОТ СЛЪНЧЕВИТЕ ЛЪЧИ

U.V. ЗАЩИТА ОТ СЛЪНЦЕ

ORGANIC FARMING

ОПИСАНИЕ: Ефективна защита от слънчев пригор за дини, пъпеши, ябълки, домати, краставици, червени плодове. Повърхността на плодовете, изложени на слънце обикновено е с температура от 10-18°C по-висока от измерената температура на въздуха. Когато температурите са високи, рискът от повреди се увеличава: при повече от 40°C има висок риск от некротични петна, при повече от 35°C, рискът от покафевяване става висок, а при теператури между 30°C и 35°C, степента на повреди зависи от вятъра, интензитета на слънцегреене, влажността и нивото на аклиматизация на плодовете към слънцегреене и други климатични фактори, които влияят на културите.

ПРЕДИМСТВА

- Защитава плодовете от покафеняване от слънчево изгаряне
- Филтрира част от УВ и инфрачервените лъчи и намалява повърхностната температура и оксидацията на плодовете
- Повишава добива, качеството и търговския изглед на реколтата поради ефекта на защита
- Има бариерен ефект върху листната повърхност, избягвайки дехидратацията в следствие на високи температури
- Повишава срока на съхранение след беритба на плодовете
- Формулацията допрнася за добро покриване на плода

СЪСТАВ

• Калций (CaO)	14,00 %
• Цинк (ZnO)	3,00 %
• Бор (B)	0,40 %

ОПАКОВКА

- 10 л

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ДОЗА

1. 2 л/дка. Листно третиране
2. 2 л продукт/ 100 литра вода
3. За по-добро покритие, скоростта на третиране не трябва да надвишава 3,5 км/ч
4. Да се съхранява при температури от 4°C до 30°C

AFEPASA PALLARÈS SULPHUR SINCE 1893

ПРОИЗВОДИТЕЛ:
AFEPASA SA – Испания

ВНОСИТЕЛ: АГРОТЕКСИМ ЕООД
1574 София, бул. Шипченски проход № 79
тел.: 02/ 870 00 33, факс: 02/ 870 73 68
e-mail: agrotexim@abv.bg, agroteximbg.com

ОБЩИ НАСОКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА СОЛДЕФЕНД

Първото приложение на СОЛДЕФЕНД трябва да е преди /около 3-5 дни/ очакваната висока честота на слънчева светлина. Да се има предвид, че важното е интензитета и продължителността /часовет/ на слънцегреенето, а не температурата.

Второ приложение: 20-30 дни след първото, ако все още се очаква силно слънцегреене.

Трето приложение обикновено не е необходимо, тъй като всяко приложение действа за 20-30 дни, а пиковите слънчеви часове обикновено са само през юли и август. На някои места е достатъчно 1 приложение, тъй като високата степен на слънчевото греене е концентрирана само в две седмици.

Относно дозата за приложение, винаги се старайте да използвате 2% работен разтвор. Ако за един декар е необходим 100 л работен разтвор, то дозата е 2 л СОЛДЕФЕНД/дка за едно третиране. Ако обаче за вашата култура е достатъчен разтвор от 50 л/дка, то тогава дозата за декар е 1 л СОЛДЕФЕНД.

Също така, при зимни зеленчукови култури в оранжерии, СОЛДЕФЕНД може да се използва през септември-октомври, за да се защитят новите растения /прирастите/, а не плодовете.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

СОЛДЕФЕНД има три съставки със следното действие:

- Калций: покрива растението и отразява част от слънчевата светлина, намалявайки температурата на повърхността.
- ZnO: този компонент действа като филтър за UV лъчите. Всъщност това е същият компонент, който се използва в слънчевия лосион за хората. UV лъчението е много енергично и може да премине през калциевата покривка. Можем да кажем, че намалява количеството радиация, което растението абсорбира. По-малко радиация, по-малко нагряване във вътрешността на растението.
- Восък: СОЛДЕФЕНД съдържа вид естествен восък, който предотвратява измиването на продукта чрез пръскане, поливане или дъжд, което улеснява приложението и осигурява последействие. В случай на силен дъжд обаче може да се наложи повторно третиране.

Приложение на СОЛДЕФЕНД при лозя в района на Ивайловград.

Доза 2%.

Продуктът е приложен със закъснение, т.е. 7-10 дни след началото на интензивно слънцеегреене и висока атмосферна температура.